



Les conditions de réalisation de ce test peuvent être différentes d'un prescripteur à l'autre. Dans tous les cas, respecter les consignes du médecin si celles-ci sont clairement explicitées.

HGPO à 75 g chez la femme enceinte :

Test de 1^{ère} intention :

But :

Il s'agit d'un dépistage précoce du diabète gestationnel.

Produit administré :

- Solution glucosée à absorber fournie par le laboratoire (75g).
- Relever le n° de lot et l'enregistrer en commentaire sur le dossier du patient.

Préparation du patient – Durée de l'épreuve :

Sujet à jeun depuis la veille.

L'épreuve dure 120 minutes.

Protocole :

- Prélèvement glycémie à jeun au **T0**.
- Administration per os de la solution glucosée (**75g**).
- Prélèvements aux temps **T60** et **T120**.

Absorption du soluté 75 g

T0 1 ^{er} prélèvement à jeun	T60 Prélèvement		T120 Prélèvement
			



Test de O'Sullivan :

Test de 2ème intention pratiqué chez la femme enceinte uniquement sur prescription explicite et motivée du médecin :

But :

Il s'agit d'un test simplifié d' Hyper Glycémie Provoquée par voie Orale (HGPO) visant au dépistage précoce du diabète gestationnel.

C'est une épreuve qui s'effectue entre la 24ème et la 28ème semaine d'aménorrhée en l'absence de facteur de risque de diabète ou dès la 1^{ère} consultation prénatale s'il existe des facteurs de risque connus.

Produit administré :

- Solution glucosée à absorber (50g), fournie par le laboratoire.
- Relever le n° de lot et l'enregistrer en commentaire sur le dossier du patient.

Préparation du patient – Durée de l'épreuve :


Sujet à jeun depuis la veille

L'épreuve dure 60 minutes

Protocole :

- Glycémie à jeun, T0
- Absorption per os d'une solution glucosée de 50 g de glucose sur une durée inférieure ou égale à 5 minutes
- Glycémie à T+ 60 mn
- NB : le temps 0 est facultatif (selon prescription médicale)

Absorption du soluté 50 g





HGPO de confirmation :

Test de 2^{ème} intention pratiqué chez la femme enceinte uniquement sur prescription explicite et motivée du médecin pour confirmation de positivité du test l'O'Sullivan:

But :

Epreuve complémentaire pratiquée en 2^{ème} intention chez la femme enceinte.

Produit absorbé :

- Solution glucosée à absorber de 100 g de glucose.
- Relever le n° de lot et l'enregistrer en commentaire sur le dossier du patient.

Préparation du patient – Durée de l'épreuve :

Sujet à jeun depuis la veille.

L'épreuve dure 180 minutes.

Protocole :

- T0 glycémie à jeun.
- Absorption de 100 g de glucose.
- Prélèvements : T60, T120, T180.

Absorption du soluté 100 g

