La ponction

- ✓ **Désinfection du site de ponction**
- ✓ **Ne jamais palper le site après désinfection**
- ✓ **Le garrot est utilisé pour faire saillir la veine. Ne pas excéder 1 min pour la pose du garrot**
- ✓ **Ne jamais prélever sur un bras qui est perfusé, même en cas d'arrêt momentané de la perfusion**
- ✓ **Veiller au bon remplissage du tube**
- ✓ **Il est recommandé d'homogénéiser le tube dès le retrait du corps de prélèvement par plusieurs retournements lents (6 ou 7)**

- ✓ **Identifier les tubes**
- ✓ **Veiller à respecter les conditions recommandées de prélèvement et de transport.**

L'Ordre de prélèvement



Cas particulier - Le remplissage du tube citrate

Le tube citrate contient du citrate de sodium qui est un anticoagulant. Le tube doit être rempli à plus de 80% ; il existe un trait de remplissage obligatoire à atteindre pour que le prélèvement soit accepté.

Ce remplissage est nécessaire à cause du citrate présent dans le tube qui est un anticoagulant liquide ; si la quantité prélevée est trop faible, le sang sera trop dilué et les résultats seront faussés.

Il est utilisé pour :

- Les bilans de coagulation
- Le suivi de traitement anti coagulants
- Le dosage des plaquettes (si agrégation des plaquettes dans le tube EDTA)



Les tubes pédiatriques sont conseillés chez l'enfant ou en cas de prélèvements difficiles.